

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Publication périodique de la Circonscription PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE

- MINISTERE DE L'AGRICULTURE -

- SERVICE de la PROTECTION des VEGETAUX -

STATION D'AVERTISSEMENTS : Ancienne Conserverie de CASAMOZZA, LUCCIANA 20290 - BORGO  
Abonnement annuel : 65 Fr. à Régisseur recettes D.D.A. VAUCLUSE - MARSEILLE 9660 74 V

## Edition Speciale Corse

BULLETIN N° 20

DU 14 OCTOBRE 1983.



### OLIVIER S

#### . Mouche de l'Olive.

Les captures de mouches sont nombreuses depuis le début de la semaine. Le seuil de 10 % de piqures est atteint dans certaines oliveraies. Avant d'envisager un traitement, contrôler le nombre de piqures à partir d'un échantillon de 50 Olives. Nous rappelons que le seuil de commercialisation est de 3 % d'olives piquées pour les olives de conserve et de 10 % pour les olives d'huilerie.

Si le seuil est proche, faire un traitement sur la totalité du verger avec un produit à base de Diméthoate (30 g/hl). Délai d'emploi : 21 jours avant la récolte.

### A GRUMES

#### . Cicadelles vertes.

Les vendanges étant pratiquement terminées, les populations de Cicadelles vertes ont bien augmenté dans les vergers d'Agrumes. Ces Cicadelles vertes sont redoutables : chacune de leurs piqures se traduit par une petite tache claire de 4 à 5 mm de diamètre sur la peau des fruits. Lorsque les piqures sont nombreuses, les fruits sont alors déclassés.

METHODES DE LUTTE . 2 techniques sont possibles.

#### - Traitement des brise-vents :

avec un insecticide à action de vapeur. Seul le Parathion peut être utilisé pour ce traitement en doublant la dose prescrite, soit 60 g/hl afin d'augmenter sa rémanence. Il permet de détruire les Cicadelles à leur entrée dans le verger. Ce traitement est le plus souvent suffisant pour l'instant, il est d'une application plus rapide et moins coûteuse.

Si les brise-vents sont constitués de Cazuarina, peu fréquentés par les Cicadelles, le traitement sera réalisé par un passage entre les deux premiers rangs.

.../...

- traitement généralisé :

Ne se justifie que si les Cicadelles vertes sont nombreuses. On choisira des produits à base de matières actives suivantes : Méthidathion, Parathion, Formothion, Diméthoate, Méthomyl, Deltaméthrine, Cyperméthrine.

Pour protéger la production pendant la période critique qui s'étend jusqu'à la mi-Novembre, en général 2 traitements de brise-vents et 1 traitement généralisé suffisent.

CULTURES MARAICHÈRES

TOMATES :

. Mildiou.

Quelques taches sont apparues en MARANA. Les plants situés dans les parcelles humides sont particulièrement sensibles. Utiliser les matières actives suivantes en g/hl.

- Captafol	170	(nouvelles spécialités)	- Chlorothalonil	150	Daconyl
- Cuivre de l'oxychlorure	125	( " )	- Dichlofluanide	100	Euparène
- Manèbe	200	( " )	- Propinèbe	210	Antracol
- Mancozèbe	160	( " )			

et associations.

. Cladosporiose.

Restez vigilants : de nombreuses taches sont visibles actuellement. Utiliser Triforine 28,5 g/hl (Denarin, Saprol, Funginex).


. Septoriose.

Les risques d'apparition de cette maladie sont importants. Utiliser des produits à base de Manèbe ou de Mancozèbe.

ARTICHAUTS :

. Apions

Ils pullulent dans de nombreux secteurs. Ces petits charançons noirs creusent des galeries à l'intérieur de la hampe florale. Utiliser de préférence de l'Endosulfan à la dose de 60 g de matière active par hl. (Thiodan, Agrophyte).



Apion de l'artichaut :  
adulte (x 16)

IMPORTANT

Pour tous les produits concernant les cultures maraîchères, bien respecter les délais d'emploi avant récolte.